



耳滴劑正確使用須知(1/2)

如何正确使用此藥？

1. 耳滴劑通常用於治療耳部感染，常見成分包括下列幾種：
 - (1) 硼酸：具微弱抗感染作用，局部使用可在表層發揮抗菌與抗黴菌藥效。可用於治療急、慢性外耳炎及耳部黴菌感染症，但禁用於耳膜穿孔性中耳炎。
 - (2) 抗生素：具殺菌作用。
 - (3) 類固醇：具消炎及止癢之作用。
2. 藥品不使用時應旋緊瓶蓋，依藥袋上說明及指示儲存、以免藥品變質失效。
3. 使用前後均須用肥皂和清水將手徹底洗淨。
4. 含類固醇之藥品如連續使用七天，而臨床症狀仍未見改善時應停止用藥，以避免類固醇掩蓋了潛伏的擴大感染現象。
5. 如耳滴劑滴完後自耳道外漏，請使用沾過藥液之棉球擦拭，因乾棉球擦拭易將藥液吸走。
6. 為保持藥液的清潔，應保持滴管頭的乾淨，應避免其它東西接觸到滴管頭而造成污染。

使用此藥時該注意什麼？（為了使操作步驟更簡單，最好請他人幫你滴藥）

1. 先使用濕的毛巾清潔耳朵，再將耳朵擦乾。
2. 用肥皂及清水將雙手洗淨。
3. 使用前需檢查滴劑的滴嘴是否有破損。
4. 如遇需冰存之藥品，請放置於冰箱冷藏。使用前務必將藥品握在手心數分鐘以回溫，並於回溫後再使用。
5. 若滴劑是混濁的懸浮液，使用前先充分振搖約十秒鐘。
6. 若藥品附有滴管，將藥液吸至滴管並使滴管頭朝下。
7. 以側躺或傾斜之姿勢，使將給藥的耳朵朝上。為使耳滴劑流入耳內，成人要將耳朵往後上方拉，小孩要往後下方拉。
8. 將正確的藥量（1~2 滴）滴入耳朵，然後輕拉耳朵使藥液流入。
9. 保持耳朵傾斜向上數分鐘，使藥品停留在耳朵內。
10. 使用完畢後，馬上將滴管或瓶蓋歸回原位並將蓋子旋緊。
11. 將雙手洗淨。
12. 除上述方法外，另可將紗布浸透藥液後，擦於外耳道內。
13. 若症狀持續數日或嚴重時或給藥後耳道癢或有燒灼感，請停藥並立即就醫或與醫師連絡。

耳滴劑正確使用須知(2/2)



☞ 藥品之儲存：

- 1、 除有特別指示應置放於冷藏室，否則請連同藥袋置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，避免冷凍。
- 2、 請勿放在孩童可以取得的場所。