



## 陰道栓劑正確使用須知

### 用藥小常識：

- 1、栓劑於室溫下呈凝固狀態以方便投予，於體溫下才會融化，並呈現藥效。故保存之溫度高於體溫時，極易產生軟化、變形等現象。栓劑如軟化或融化時，以原包裝浸於冷水中（20°C以下）或放回冰箱冷藏即可凝固。
- 2、藥品不使用時應維持藥廠原包裝，不得自行拆裝，以免藥品失效變質。
- 3、使用前後均須用肥皂和清水將手徹底洗淨。
- 4、使用後如有黏稠或水液狀之液體自陰道流出，屬正常現象，可在內褲底部墊衛生棉墊，勿立即進行陰道之沖洗。
- 5、晚上睡覺前使用，可使藥品停留在陰道之時間延長，而提高療效。
- 6、藥品使用時應放入陰道深處，月經期間仍要繼續用藥，不可擅自中斷用藥。
- 7、孕婦不可使用陰道送藥器，以避免刺激陰道，造成子宮收縮而致流產。
- 8、用藥期間應避免性交，或請男性使用保險套，以避免交叉感染。

### 使用須知：

- 1、以肥皂及清水徹底洗淨雙手。
- 2、將陰道栓劑之包裝去除。
- 3、最好戴上手套。
- 4、可將栓劑迅速以溫水濕潤。
- 5、人躺下，小腿弓起，膝蓋朝上，用手或特殊送藥器將藥品送入陰道深部。
- 6、每次使用完畢後，用肥皂及溫水清洗送藥器並將之晾乾，並徹底洗淨雙手。



### 藥品之儲存：

- 1、除有特別指示，請將藥品連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存。
- 2、避免放在孩童可以取得的場所。