



制酸劑藥品使用須知

醫師為何開此藥：

制酸劑俗稱胃藥，成分以含鋁或(及)鎂之化合物為主，主要作用為中和胃酸，用以緩解或預防因為胃酸過多所引起的心口灼熱感、胃脹氣或消化不良的症狀，也可用來治療或預防潰瘍的發生。

如何使用此藥：

- 1.請遵照醫師或藥師指示服藥。一般建議於飯後一小時內服用，可維持約三小時之藥效。
- 2.咀嚼錠必須嚼碎後，並喝下適量的水再行吞服；胃乳於使用前請振搖均勻。

使用此藥時該注意什麼：

- 1.應按時回診，若您服用此藥已超過一週以上，而疼痛未解除，則請聯絡醫師。
- 2.服用含鎂制酸劑(如氧化鎂)可能造成腹瀉；含鋁制酸劑可能造成便秘。
- 3.制酸劑會影響許多藥品之吸收，可能造成藥品作用降低，如：強心劑、抗生素(如抗黴菌劑)、鐵劑及某些抗潰瘍劑，如無法避免併服時，應先服用其它藥品，於二小時後再服用胃藥，或者詢問醫師或藥師。
- 4.重碳酸鈉及碳酸鈣之中和能力強但安全性較低，須經醫師評估，才決定使用與否。
- 5.請將本劑連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍。請勿放在孩童可以取得的場所。
- 6.服用此藥期間如需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。

此藥品可能引起的副作用及處理方式：

可能發生症狀：食慾減退、腹瀉、便秘、疲勞、味覺不佳。

若症狀持續數日或嚴重時，請停藥並立即就醫或與醫師連絡。

忘記服藥時該怎麼辦：

若忘記服藥，則於想起時儘快服用；如果一天服藥超過兩次以上，若距離下次服藥時間少於4小時，則不需要補服，按原時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

懷孕或哺乳時該怎麼辦：

在正常情況下，鎂與鋁離子幾乎不吸收，僅停留在腸胃道再從糞便排出，安全性較高，如經醫師評估後須使用，可適用於孕婦。