

肛門栓劑正確使用須知




用藥小常識：

1. 栓劑於室溫下呈凝固狀態以方便投與，於體溫下才會融化，並呈現藥效。故保存之溫度高於體溫時，極易產生軟化、變形等現象。栓劑如軟化或融化時，以原包裝浸於冷水(20°C以下)或放回冰箱冷藏即可凝固。
2. 藥品不使用時應維持藥廠原包裝，不得自行拆裝，以免藥品變質失效。
3. 使用前須用肥皂和清水將手徹底洗淨。
4. 使用後如有黏稠或水液狀之液體自肛門流出，乃因藥品放置不夠深入，屬正常現象。

使用須知：

1. 以肥皂徹底洗淨雙手。
2. 除去外包裝前，如發現栓劑太軟，可置於冷水中使之變硬。
3. 撕開外包裝。
4. 如只需使用半粒，請以乾淨刀片平均切開。
5. 如可能的話，請帶上指套或手套。
6. 以水溶性潤滑劑如 K-Y 凝膠潤滑栓劑前端（凡士林為油性潤滑劑）。如無此類潤滑劑，可改用溫開水濕潤肛門周圍。
7. 側躺後把靠下方的腿伸直，而上方的腿則往胃部方向前彎。
8. 把臀部往上拉高以露出肛門部份。
9. 用手指把栓劑尖端部份插入肛門括約肌直到超過約 2.5 公分深（嬰兒超過約 1.25 到 2.5 公分）的位置。如果沒有插入超過此深度，栓劑可能會被排出。
10. 用手把臀部向內壓幾秒。
11. 持續躺下約 15 分鐘以避免栓劑被排出。
12. 把使用過的物品（如手套等）丟棄，並徹底洗淨雙手。



藥品之儲存：

1. 除非有特別指示，請將藥品連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存。
2. 請勿放在孩童可以取得的場所。