

## 抗生素藥品使用須知



### 醫師為何開此藥？

抗生素具有消滅或抑制其他微生物生長之作用，用於治療微生物感染疾病。

### 如何使用此藥：

- 1.請遵照醫師或藥師指示之間隔服藥，服藥時請以一大杯水併服。
- 2.一般抗生素以空腹服用(飯前一小時或飯後二小時)之吸收效果較好，但若對胃部造成刺激，則可與食物一起服用為宜，請遵照醫師、藥師指示服藥。
- 3.如為口服之長效釋放錠，請勿咬碎；如為口服懸浮液，使用前要搖勻，並使用量杯或包裝盒內所附之滴管，量取正確之藥量。

### 使用此藥時該注意什麼：

1. 請依醫師指示服用。治療期間即使症狀消失，仍不可擅自停藥，需完成整個療程才能根治疾病，否則可能會復發或造成抗藥性菌種之產生。
2. 治療期間或療程結束後，感染症狀一直無法改善或更加嚴重請告知您的醫師。
3. 若您曾有藥物過敏、目前懷孕或授乳、其他疾病（氣喘或肝腎疾病等），請務必告知醫師以決定應否用藥。
4. 有些抗生素，因會與鈣、鎂、鋁、鐵等離子結合而失去藥效，故應避免與牛乳或乳類製品、制酸劑及含鈣、鐵質高的食物一起服用。
5. 蠶豆症之患者應避免使用磺胺類抗菌劑，以免產生溶血性貧血。
6. 四環素類易導致牙齒琺瑯質發育不全及永久性之變色，因而禁用於8歲以下之兒童、孕婦及授乳婦女。此外，服用此類藥品可能會對光過度敏感，服藥期間應避免過度暴露於日光燈或太陽下。
7. 抗生素之懸液粉劑請依藥袋指示泡製後再行服用，依藥品種類之不同，稀釋後之保存期限請依藥袋之指示說明。
8. 有些泡製後的懸浮液須置於冰箱儲存，請注意藥袋上的指示。
9. 請將藥品連同藥袋放置於密閉容器，置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，勿放在孩童可以取得的場所。
10. 勿讓他人服用您的藥品；服用此藥期間如需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。

### 此藥品可能引起的副作用及處理方式：

若症狀持續數日或嚴重時，請停藥並立即就醫或與醫師連絡。

可能發生：噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛腹脹、喉嚨發炎、呼吸困難、氣喘、發紅、發癢、不正常出血、皮膚或眼睛顏色變黃、食慾降低、味覺變差等。

### 忘記服藥時該怎麼辦：

若忘記服藥，則於想起時儘快服用；如果一天服藥超過兩次以上，若距離下次服藥時間少於4小時，則不需要補服，按原時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

### 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

孕婦、計畫懷孕或授乳的婦女，請於就診時告知醫師。若於服藥期間發覺已懷孕，請務必詢問您的醫師，醫師將就其危險與利益加以評估，而決定續用與否。