



磺胺類藥品 (Sulfa-drug) 服用須知

📖 使用此藥時該注意什麼：

1. 遵照處方服用完整療程，即使治療期間感覺症狀好轉，仍應繼續服藥。
2. 治療期間，須定期回診抽血驗尿檢查，以確保用藥安全性及有效性。
3. 治療期間，避免長期曝露於日光或紫外光下，因為可能發生對光敏感的現象。如果在戶外，請穿長袖衣服保護或塗防晒製品。
4. 若有結晶尿、皮膚發疹、耳朵內有鈴鈴聲、呼吸困難、發燒、喉嚨痛或寒顫等現象時，應立即告知醫師。
5. 為確保安全，要飲用充足的液體（每天 2000-3000 西西），以避免發生結晶尿(尤其是長效性磺胺藥)。
6. 如果您目前正在服用抗凝血藥 warfarin、抗癲癇藥 phenytoin，抗腫瘤藥 methotrexate，或需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。
7. 請將本劑連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍。請勿放在孩童可以取得的場所。
8. 您如患有肝腎疾病，G6PD 缺乏症（俗稱蠶豆症），紫質症，甲狀腺疾病等疾病，請主動告知醫師。

📖 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論；不建議於授乳期間使用本品，最好能改用其它的乳製品以取代母乳。