

特息敏 錠 2 毫克

Dex-CTM Tablets 2mg

本品係由 Dexchlorpheniramine Maleate 研製而成之抗組織胺劑，其抗組織胺作用是在作用器細胞上之所有接受器與組織胺競爭，能緩解許多過敏症狀。

【成分】每錠中含有

有效成分及含量：Dexchlorpheniramine Maleate.....2mg

其他成分(賦形劑)：Lactose monohydrate, Magnesium stearate, Corn starch, New coccine aluminum lake.

【用途 (適應症)】

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

【使用上注意事項】

1. 有下列情形者，請勿使用：
 - (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (1) 3 歲以下。
 - (2) 嚴重代謝性肝腎疾病的人。
 - (3) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (2) 65 歲以上。
 - (3) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
 - (4) 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。
4. 其他使用上注意事項：
 - (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (2) 避免陽光直射。
 - (3) 勿超過建議使用量。
 - (4) 不得與酒精性飲料併用。
 - (5) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

【用法用量】

年齡	劑量	使用次數
成人及12歲以上	每次1錠	一日3至4次，每次間隔4時小以上服用
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2錠	
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之1/4錠	
3歲以下	請洽醫師診治	

【警語】

1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮。
其他	口乾、視覺上之困擾。

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 - (1) 若有任何不適情況產生。
 - (2) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】

6~1000 錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

【貯存條件】

貯存於 25°C 以下。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第 027040 號

SYNMOSA

委託者：健喬信元醫藥生技股份有限公司

地 址：新竹縣湖口鄉光復北路 21 巷 4 號

製造廠：優良化學製藥股份有限公司

地 址：新竹縣湖口鄉中興村光復路 10 號

