



Diphenidol

醫師為何開此藥？

主要用於治療內耳障礙引起之眩暈、或是梅尼艾氏症候群(包含血管障礙及頭頸部外傷所引起之暈眩)。

如何使用此藥？

按醫師指示服用。

使用此藥時該注意什麼？

1. 對藥物過敏及腎機能嚴重障礙者，禁用本劑。
2. 本劑不能使用於孕婦嘔吐治療。
3. 請將本劑連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍。請勿放在孩童可以取得的場所。
4. 服用此藥期間如需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。

此藥品可能引起的副作用及處理方式：

可能產生口渴、胸部灼熱感、散瞳、頭暈等副作用；若症狀持續數日或嚴重時，請停藥並立即就醫或與醫師連絡。

忘記服藥時該怎麼辦：

若忘記服藥，則於想起時儘快服用；如果一天服藥超過兩次以上，若距離下次服藥時間少於4小時，則不需要補服，按原時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

懷孕或哺乳時該怎麼辦：

如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論。本藥目前尚無使用於授乳婦女的資料，使用前請先詢問您的醫師或藥師。