

Amlodipine + Valsartan

● 此藥有哪些作用

降血壓藥品，治療高血壓。

● 如何使用此藥

- 請依醫師指示以及藥袋說明

● 使用此藥時該注意什麼

- 應告知醫師疾病狀態(如：肝腎疾病、心血管疾病等)、正在服用的藥物、以及是否有藥物過敏。
- 服用此藥可能增加血鉀濃度，若您正進行低鹽低鈉飲食或使用代鹽，請告知您的醫師。
- 請避免與葡萄柚(汁)併服。
- 此藥可能引起姿勢性低血壓，服藥後起身請放慢行動。
- 請遵照醫囑按時服藥，定期監測血壓與心跳，並按時回診追蹤檢查。
- 如果您準備懷孕或已懷孕，務必告知並與您的醫師討論；計劃哺乳的婦女，請於給藥前告知您的醫師或藥師。

● 可能引起的副作用及處理方式

症狀	處理方式
<ul style="list-style-type: none">• 過敏反應：發癢、蕁麻疹、臉部或手部腫脹、口腔或咽喉腫脹、胸悶、呼吸困難• 胸痛、冒冷汗、呼吸困難、昏厥• 四肢、嘴唇麻木、心跳異常• 尿量頻率改變、濁尿、血尿• 體重迅速增加、周邊水腫	請儘速(立即)就醫
<ul style="list-style-type: none">• 腸胃不適、腹瀉、噁心• 頭痛、眩暈	回診時請告知醫師

● 忘記用藥時該怎麼辦

- 想起時儘快服用，但如已接近下一次的服藥時間，則跳過一次，依照下一次服藥時間服用即可。不可服用雙倍劑量。

● 儲存方式

- 請置於室溫 30°C 以下、乾燥、陰涼處，避免陽光直接照射及孩童取得。

本單張並未包含所有藥品資訊，若您仍有藥物使用問題，請撥打藥袋背面各院區藥物諮詢專線

長庚醫院藥劑部 製作