



Benzyl hydrochlorothiazide

醫師為何開此藥？

本品具利尿及降血壓的作用。

如何使用此藥？

1. 請遵照醫師或藥師指示服藥。
2. 需夜間休息之患者，為避免夜間排尿，請於午前使用。

使用此藥時該注意什麼？

1. 若您對本藥、磺胺藥過敏或無法排尿，請主動告知醫師或藥師。
2. 若您正在服用降血壓、糖質副腎皮質荷爾蒙、降血糖、毛地黃等藥品，應告知您的醫師。
3. 若您患有肝、腎疾病、糖尿病或狼瘡，請告知您的醫師。
4. 服用本品時請勿飲酒，以避免藥效增強而造成姿勢性低血壓。
5. 若您覺得病況改善欲停用本劑則必須慢慢降低劑量，切勿未告知醫師自行突然停止服用本劑。
6. 此藥可能會使您頭昏眼花，若您需開車、操作機械等高危險性的工作應特別小心。
7. 請將本劑連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿放在孩童可以取得的場所。
8. 服用此藥期間如需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。

此藥品可能引起的副作用及處理方式：

若症狀持續數日或嚴重時，請停藥並立即就醫或與醫師連絡。

1. 常見副作用為：皮膚起紅疹或癢等過敏現象、口乾、食慾不振、噁心、嘔吐、胃部不適、便秘、眩暈、倦怠感等。
2. 您發生下列嚴重的症狀時，請與您的醫師聯絡：紅疹、嚴重的噁心嘔吐、頭昏眼花或昏倒、低血鉀的症狀包括疲勞、虛弱、麻麻刺刺的感覺、肌肉痙攣或心跳變快等。

忘記服藥時該怎麼辦：

若忘記服藥，則於想起時儘快服用；如果一天服藥超過兩次以上，若距離下次服藥時間少於4小時，則不需要補服，按原時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

懷孕或哺乳時該怎麼辦：

如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論；不建議於授乳期間使用本品，最好能改用其它的乳製品以取代母乳。

本單張並未包含所有藥品資訊，若您仍有藥物使用問題，請撥打藥袋背面各院區藥物諮詢專線

長庚醫院藥劑部 製作