



Chloramphenicol oph soln

醫師為何開此藥？

砂眼、葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌等所引起之眼疾患。

如何使用此藥？

1. 請確實依照醫師及藥袋上的指示使用，請勿任意增減藥量或擅自停藥。
2. 每一到四小時一次，每次點 1 滴。

使用此藥時該注意什麼？

1. 點眼藥水前要先洗手，以免經手指接觸而感染；將眼藥水點在眼白與下眼瞼之間的凹溝內，點完後放開眼瞼，眼睛儘量張開且至少不眨眼 30 秒。可以手指輕壓內眼角處的淚小管，以防止藥水流進鼻淚管進入喉嚨。
2. 如須同時使用眼藥水及眼藥膏時，先點眼藥水，間隔 5~10 分鐘再點眼藥膏。
3. 對新生兒可能導致腹部膨脹、發紺、血管萎縮等副作用，應避免使用。
4. 雖然不會引起再生不良性貧血，但長使間使用亦可能會有影響，應小心監測。
5. 應避免光線直射，一般置於冰箱冷藏，不宜冷凍；使用時先將眼藥水握在雙手數分鐘後，讓它達到與體溫相當的溫度再使用，可減少刺激感。
6. 請放置於孩童不易取得之處。
7. 使用此藥水應避免配戴隱形眼鏡。
8. 請將本劑連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿放在孩童可以取得的場所。
9. 使用此藥期間如需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。

此藥品可能引起的副作用及處理方式：

長時間使用可能會有下列症狀產生，但機會非常少；若有以下症狀產生時，只要停止給藥後即可恢復：皮膚蒼白、喉嚨發炎、發燒、不尋常出血、淤血、疲倦或虛弱。

忘記用藥時該怎麼辦：

想起時，立即使用；若已接近下次給藥時間，則只需使用下一次劑量，不可一次使用雙倍藥量。

懷孕或哺乳時該怎麼辦：

如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論；本藥可能會傷害您未出生的胎兒，懷孕婦女不建議使用。