

# “愛爾康” 均衡鹽溶液

BSS®Sterile Irrigating Solution

衛署藥輸字第 022849 號

**Alcon**  
TAIWAN

## 簡介：

BSS 為滅菌均衡鹽溶液，每毫升含有 0.64% 的氯化鈉 (NaCl)、0.075% 的氯化鉀 (KCl)、0.048% 的二水氯化鈣 (CaCl<sub>2</sub>•2H<sub>2</sub>O)、0.03% 的六水氯化鎂 (MgCl•6H<sub>2</sub>O)、0.39% 的三水醋酸鈉 (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>NaO<sub>2</sub>•3H<sub>2</sub>O)、0.17% 的二水檸檬酸鈉 (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>Na<sub>3</sub>O<sub>7</sub>•2H<sub>2</sub>O)、氫氧化鈉及／或鹽酸 (調整酸鹼值之用)，以及注射用水。其 pH 值約為 7.5，滲透壓約為 300mOsm/Kg。

**臨床藥理學：** BSS 對眼睛組織為等張性之溶液，可灌注於眼內組織。

**適應症：** 眼睛、耳朵、鼻子或喉嚨作各種外科手術過程中灌注之用。

## 警告：

- 本品不得作為注射劑或靜脈輸注之用。
- 除外包裝完整、產品呈清澈狀、封口完整且包裝袋無破損外，請勿使用。
- 若本品有變色或是有沉澱物時，請勿使用。
- 僅限單一病患使用。同一袋產品請勿使用於超過一位患者。
- 在此溶液中加入添加物可能會導致角膜失代償 (corneal decompensation)。
- 本品不含防腐劑，請丟棄未用完之溶液。

## 注意事項：

- 請在無菌環境中打開。
- 相關研究建議，在對患有糖尿病病患進行玻璃體切除術時，使用眼部灌洗液應特別注意，有可能會造成水晶體改變。
- 曾有報告指出，在眼科手術中使用 BSS 作為眼內灌洗液時，發生角膜有霧化或是水腫的現象。

## 副作用：

- 灌洗或任何其它的外傷將會導致角膜腫脹或是水泡性角膜病變 (bullous keratopathy)。
- 曾經發生過手術後的發炎反應以及意外之角膜水腫和角膜的代償機能衰敗。

**用法用量：** 本溶液的使用必須依照手術標準方法操作。

移除外包裝，以一片無菌酒精片清潔與消毒橡膠瓶塞，在無菌狀態下，將刺針刺入橡膠瓶塞之標示區域。在開始灌洗前，應先溢出部分溶液以排出空氣。

## 包裝：

**4000 公撮以下塑膠及玻璃瓶裝。100 支以下盒裝。**

250 公撮、500 公撮玻璃瓶裝，為使用灰色橡皮塞與鋁環密封，再加上藍色聚丙烯套蓋：

250 公撮溶液裝於 325 公撮的玻璃瓶內：PIC 006507935

500 公撮溶液裝於 635 公撮的玻璃瓶內：PIC 006507936

## 90 公撮裝：

90 公撮溶液裝於 100 公撮的聚丙烯單劑量瓶內，其包含一可摺疊的聚丙烯袋與橡皮塞及鋁環。

## 500 mL 袋裝：

保存於乾淨聚丙烯 (Polypropylene) 袋中供應，上有灰色丁基橡膠 (butyl) 瓶塞並以鋁箔封口，外包裝為多層乾淨的塑膠套。在聚丙烯袋之外還套上多層乾淨的塑膠袋。

每袋中有 500 mL：NDC 0065-1795-04。

**貯存：** 儲存於 36° - 77°F (2° - 25°C) 中，請勿冷凍。

**本品須由醫師處方使用。**

製造廠：ALCON LABORATORIES, INC.

廠址：6201 South Freeway, Fort Worth, Texas 76134, U.S.A.

藥商：瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司

地址：新北市新店區寶中路 119 號 4 樓

電話：(02)2917-2468